

WCET®的相关内容

文献引用 World Council of Enterostomal Therapists®. Around the WCET® world. WCET® Journal 2023;43(3):10.

将国际皮肤撕裂伤专家咨询组的皮肤撕裂伤分类付诸实践

国际皮肤撕裂伤专家咨询组（ISTAP）于2011年制定了皮肤撕裂伤分类系统¹。随后进行了一项研究，以确定该系统在临床实践中的有效性²。这项研究表明，ISTAP分类便于不同临床环境以及不同国家的执业医师使用。随后，还于2019年在44个国家进行了一项规模更大的验证研究，纳入了1601例参与者³。这项研究得出结论，该分类系统的有效性和可靠性得到了证据支持，并建议将其作为全球临床实践和研究中皮肤撕裂伤系统评估和报告的首选系统。

ISTAP皮肤撕裂伤分类系统将皮肤撕裂分为以下几类：1类为无组织损失的线性或皮瓣皮肤撕裂伤，2类为部分皮瓣损失（皮瓣无法重新定位覆盖伤口床），3类为完全皮瓣损失（图1）。

出现皮肤撕裂伤时，首先应采取的急救措施是止血，然后轻轻清洁伤口以清除任何碎屑。如果存在皮瓣，应重新对位以覆盖伤口，然后使用ISTAP皮肤撕裂伤分类系统对皮肤撕裂伤进行分类⁴。

目前，该分类系统有除英语外的其他14种语言版本可用，包括阿拉伯语、捷克语、荷兰语、法语、希伯来语、日语、西班牙语、中文、丹麦语、德语、意大利语、葡萄牙语、瑞典语和土耳其语

（skintears.org）。ISTAP很高兴能够为这些国家的同事提供支持并与他们合作，协助完成翻译工作，并就其执行情况提出建议。

我们认识到，当前系统反映了大多数高加索人皮肤出现皮肤撕裂伤的情况，因此开发ISTAP分类系统的下一步工作是确保在各类不同肤色的人群中对其进行验证。ISTAP希望您提供相关帮助！我们期待有机会与同事合作，创建不同肤色皮肤撕裂伤图像的资料库。同时，我们还鼓励想要在不同人群（特别是具有不同肤色的小组）中对ISTAP分类进行验证的人员与我们联系（info@skintears.org），以获得相关支持。

参考文献

1. LeBlanc K, et al. (2011) Skin Tears – State of the Science: Consensus Statements for the Prevention, Prediction, Assessment, and Treatment of Skin Tears *Advances in Skin & Wound Care*. 24(9): 2-15.
2. LeBlanc K, Baranoski S, Holloway S, Langemo D. Validation of a new classification system for skin tears. *Adv Skin Wound Care*. 2013 Jun;26(6):263-5. doi: 10.1097/01.ASW.0000430393.04763.c7. PMID: 23685526.
3. Van Tiggelen H. et al. (2019), Standardizing the classification of skin tears: validity and reliability testing of the International Skin Tear Advisory Panel Classification System in 44 countries. *Br J Dermatol*. doi:10.1111/bjd.18604
4. Holloway S & LeBlanc K. Reapproximating a Skin Tear Flap. *Advances in Skin & Wound Care* 35(8):p 462-463, August 2022. | DOI: 10.1097/01.ASW.0000835124.90642.ce



图1 ISTAP皮肤撕裂伤分类系统

Samantha Holloway
ISTAP主席